ニ達スル、東大腊葉室ニハ小泉源一博士ガ 1914 年 5 月ニ採集サレタ二枚ノ良イ標本ガアリ、'*Arabis senanensis* MAKINO var. *alpicola* KOIDZ.' ト小泉博士ガ書カレテ居テ、ソノ下ニ鉛筆デ '*A. alpicola* (KOIDZ.) MAKINO いぶきはたざほ' ト牧野博士ノ手書ガアル。併シ共ニ未發表デアルカラココニ記載ヲツケテオク。はくさんはたざほハ無毛カ又ハ僅ニ毛ノアルモノデアルガ、他ノ點ハ兩者一致スルノデ、いぶきはたざほハソノ變種トシテ扱フ事ニスル。尙はくさんはたざほニツケラレタ最古ノ種名ハ *Cordamine gemmifera* MATSUMURA (1899) デ、ソレヲ *Arabis* ニウツシタ *Arabis gemmifera* MAKINO ガ正名デアリ、從ツテいぶきはたざほハ *A. gemmifera* var. *alpicola* (KOIDZ.) HARA ト改メル。北海道ノをしまたねつけばな (*Arabis Greatrexii* MIYABE et TATEWAKI, *Cardamine Greatrexii* MIYABE et KUDO) ハ花ハ少シ小サイガはくさんはたざほノ一形ト思ハレ、又 *Arabis Maximowiczi* N. BUSCH (1922) ノ少クモ一部ハ同種デアル。

Arabis gemmifera (MATSUMURA) MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIV, p. 224 (1910) pro syn.

var. **alpicola** (KOIDZUMI) HARA, var. nov.

Syn. *Arabis senanensis* MAKINO var. *alpicola* KOIDZUMI in sched. Herb. Univ. Imp. Tokyo.

Arabis alpicola (KOIDZUMI) MAKINO in sched. Herb. Univ. Imp. Tokyo.

Caulis dense molliter hirsutus, pilis longis albis sæpe subretrorsis. Folia præcipue caulina dense pubenscentia, pilis vulgo bifurcatis. Pedicelli hirsuti. Sepala pilis parvis bifurcatis parce obtecta. Cetera ut in typo.

Nom. Jap. *Ibuki-hatazao.*

Hab. Honshu: prov. Ômi: in monte Ibuki (G. KOIDZUMI-Maj. 1914—typus)—ibid. (S. SAITO-Jun. 28, 1929).

Planta endemica. (原 寬 H. HARA)

○ほざきしほがま

今秋北海道池田高等女學校ノ横山春男氏カラ送ラレタ標本中ニほざきしほがま (*Pedicularis spicata* PALLAS) ガアツタ。同種ハ北朝鮮・北支那・滿洲・沿海州・ダフリヤ等ニ分布スルモノデ北海道デハ勿論初發見デアル。莖ハ高サ 50–60 cm 許、枝ヲ分チ、全體ニ軟毛ヲ布キ、葉ハ稍しほがまぎくニ似テキルガ四枚輪生シテキル。八月枝端ニ密ナ穗ヲナシテ紅紫色ノ比較的小形ノ花ヲ着ケル。苞ハ長卵形デ緣邊ニ鋸齒ガアリ基部ハ急ニ細マツテ短柄ヲナシ、蕚ハ鐘形デ五齒緣、花筒ハ基部デ屈曲シ、花兜ハ短ク下唇ノ半長デ無嘴、下唇ハ三裂スル。横山氏ニヨレバ、十勝足寄(アヨロ)カラ士幌ニ通ズル道路附近ヤ芽登(メトウ)市街附近ノ路傍ニ稀ニ見出サレ、陽地ノ濕氣ガアツテシカモ水通シノヨイ場所ヲ好ムトノ事デアル。産地ガ路傍デアルノデ移入サレタモノデハナイカトノ心配モアルガ、少クトモ今ハ自生狀態デアル。尙横山氏ニヨツテやなぎぬかぼ (*Persicaria paludicola* NAKAI) ヤはんもみぢごきづる

(*Actinostemma labatum* MAXIMOWICZ var. *semilobatum* MAKINO) モ十勝池田町附近ニ產スル事ガ明カニサレタ。

Pedicularis spicata PALLAS, Reise Russ. Reich. III, p. 738 (1776).

Nom. Jap. *Hozaki-shiogama.*

Hab. Yezo : prov. Tokachi : circ. Metô in oppido Ayoro-mura (H. YOKOYAMA-Aug. 16, 1936 ; no. 3222).

Dist. Korea bor., China bor., Manshuria, Primorskaja et Dahuria.

New to the Japan Proper. (原 寛 H. HARA)

○Mc CLURE 氏ニ竹ノ話ヲ聽ク (T. NAKAI : Conversation with Mr. Mc CLURE on bamboos.)

廣東嶺南大學ノ傭教師 F. A. McCLURE 氏ガ8月11日ニ令孃ヲ同伴シテ教室ニ筆者ヲ訪レタ。氏ハ廣東デ竹類ヲ硏究シテ居リ私ノ書ク竹類ノ論文ニハ殊ニ注意シテ屬ノ區分ナドハ常ニ贊成シテ吳レテ居ルガ氏ハ WILLDENOW, MUNRO, RETZIUS ナドガ硏究シタ竹ノ標本ヲ檢シタ結果ヲ次ノ樣ニ話シテ行ツタ。尙ホ氏ハ學問ハ共同同作デ完成スルモノデアツテ徒ニ他ヲ出シ拔テヤル樣ノ事ハ學問ヲ混亂セシムル因ヲナスカラ今後自身デ竹ニ就テ何カ書カウト思フ時ニハ必ズ筆者ノ意見ヲ聽テカラニスルカラ宜シク賴ムト言ヒ殘シタ之ガ眞ニ學者的態度ト謂フベキデアル。

1) LINNÆUS 氏ノ *Arundo Bambos* ハ RHEED ノ Hortus Malabaricus. I, t. 16 = *Ily* ナル名デ出テ居ル圖ヲ基ニシタモノデ Book species デアル。其ハ今謂フ *Bambusa arundinacea* RETZIUS 卽チ刺ノアル竹デアル。

2) 然シ RETZIUS 氏ノ *Bambos* 屬又ハ *Bambos arundinacea* 卽チ Fasciculus Observationum Botanicarum quintus 24 (1789) ニ出テ居ルモノハ KÖNIG ガ支那デ採集シタモノデアツテ今謂フ *Bambusa vulgaris* SCHRADER デアルカラ刺ノナイ方ノ竹デアル。

3) 未ダ SCHREBER ノ Genera Plantarum ニアル *Bambusa* ノ標本ヲ見ナイカラ *Bambusa* 屬ハ刺ノアル方カナイ方カハ判ラヌ。

4) Berlin ニアル WILLDENOW 氏ノ標本ヲ見ルト彼ノ *Bambusa arundinacea* モ刺ノナイ *Bambusa vulgaris* デアル。其故今迄 *Bambusa* 屬ノ基本種ヲ刺ノアル *Bambusa arundinacea* RETZIUS トシテ居ルガ RETZIUS ノ type ハ刺ノナイ方ダカラ變ナ事ニナル。然シ刺ノアル *Bambusa* ト刺ノナイ *Bambusa* トヲ別屬ニスル筆者ノ意見ニハ贊成スル云々。

5) *Bambusa angulata* MUNRO ハ四方竹デハナイ MUNRO ハ *Dendrocalamus latiflorus* ヲ間違ヘテ居ルノデアルカラ *Tetragonocalamus angulatus* NAKAI ハ四方竹ニハ使ヘナイ。又其花ノ記相文モ CAMUS ノ記シテ居ルノモ皆此ヲ間違ヘタ MUNRO ノ標本カラ採ツタモノ故之ハ四方竹デハナイ。四方竹ノ花ハ未ダ嘗テ吹タコトハナク標本モナイ。

6) *Sinarundinaria* NAKAI ハヨイ屬デアル。但シ稈ハ側生 (Monopodial) デハナク頂生 (Sympodial) デアル。從ツテ殆ンド株立ニナル。自身デ掘ツテ見タガ此點ダケデモ立派